

Ueber  
**acute Osteomyelitis.**

---

**Inaugural-Dissertation**

zur

**Erlangung der Doctorwürde**

unter dem Präsidium

**des Herrn**

**PROF. DR. RITTER VON NUSSBAUM**

der

**hohen medicinischen Facultät zu München**

vorgelegt

von

**Julius Hofer**

Assistenzarzt 2. Cl. im k. 13. Infanterie-Regiment  
„Kaiser Franz Joseph von Oesterreich“.

---

**München 1883.**

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Ueber  
**acute Osteomyelitis.**

---

**Inaugural-Dissertation**  
zur  
**Erlangung der Doctorwürde**  
unter dem Präsidium  
**des Herrn**  
**PROF. DR. RITTER VON NUSSBAUM**  
der  
**hohen medicinischen Facultät zu München**  
vorgelegt  
von  
**Julius Hofer**  
Assistenzarzt 2. Cl. im k. 13. Infanterie-Regiment  
„Kaiser Franz Joseph von Oesterreich“.

---

**München 1883.**

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Auf der chirurgischen Station des kgl. Militärlazarettes zu Ingolstadt kam im Februar des Jahres 1882 ein Fall von acuter Osteomyelitis zur Beobachtung, der wegen der Eigenartigkeit seines Verlaufes und Ausganges werth sein dürfte, ihn einer näheren Besprechung zu unterziehen.

Oekonomie-Handwerker Franz Schuller der 5. Compagnie des kgl. 10. Infanterie-Regiments, 21 Jahre alt, wurde am 20. Februar 1882 in das Garnison-Lazaret aufgenommen. Er gab an, früher immer gesund gewesen zu sein und besonders nie eine ernstere Krankheit durchgemacht zu haben. Seit 4 Tagen leide er an Schmerzen im linken Kniegelenke und dessen Umgebung, so daß er kaum mehr gehen könne. Die Untersuchung ergab folgenden Befund: Anämisches Aussehen, scrophulöser Habitus, Ernährungszustand mittelmäßig. Das linke Kniegelenk und die perarticulären Weichtheile, besonders die oberhalb des Gelenkes sich befindlichen, zeigten hochgradige Schwellung und Schmerzhaftigkeit. Das Knie stand in Flexionsstellung, passive und aktive Bewegungen waren nur in geringem Grade ausführbar und mit heftigen Schmerzen verbunden; die Temperatur war lokal und im Allgemeinen erhöht (T. 39,0), Puls 104 in der Minute. Die Herztöne waren rein, aber dumpf, der Appetit normal, der Stuhlgang regelmässig. Die übrigen Organe erwiesen sich als gesund, im Urin kein Eiweiß.

21. Februar: Applikation einer Eisblase auf das erkrankte

Knie, Einbettung der Extremität in eine Drahthose, innerlich als Antifebrile, salicylsaures Natron. Wegen Stuhlverhaltung ein Klysma. T. Morgens 38,4, Abends 39,5. Puls 96.

22. Februar: In den nächsten Tagen änderte sich der Zustand des Patienten wenig. Die Schmerzen dauerten in gleichem Grade fort, das Knie wurde in starker Flexionsstellung gehalten, die Extension war wegen der dabei auftretenden Schmerzen nicht vollständig ausführbar. Die Temperaturen waren fortwährend hohe mit morgentlichen Remissionen. Der Appetit war im Ganzen gut, der Stuhlgang normal, Zunge belegt. Da Patient bei ruhiger Lage keine besondere Schmerzhaftigkeit verspürte und auch des Nachts größtentheils schlief, so wurden keine Narcotica gereicht. Ein Gypsverband, der am 25. Februar angelegt worden war, mußte am 28. wieder abgenommen werden, da Patient den durch ihn ausgeübten Druck nicht ertragen konnte.

In den ersten Tagen des März trat unter hohem Fieber und bedrohlichen Allgemeinerscheinungen, verbunden mit heftigen, bohrenden Schmerzen, eine bretharte Infiltration der Weichtheile der Kniekehle ein, die sich nach oben fast bis zur Mitte des Oberschenkels fortsetzte; auch an der Vorderfläche des Femur hatte die vorher bestandene Schwellung nunmehr einer harten Infiltration Platz gemacht. Die Betaftung war für Patienten äußerst empfindlich, die Temperatur 39,9, Puls 104. Die alsbald vorgenommene Messung ergab folgende Resultate:

Umfang des Knies, über die Patella gemessen: Links 39 cm, rechts 32 cm, Oberschenkel. in der Mitte gemessen: Links 44 cm, rechts 39 cm.

8. März: Auf die zunächst eingeleitete Behandlung: Tägliche Einreibungen des erkrankten Gliedes mit Ungt. cinereum, schien die Infiltration etwas zurückzugehen; auch die Schmerzen verringerten sich etwas, allein eine wesentliche Besserung wurde nicht erzielt.

Am 12. März mußten die Einreibungen mit Ungt. ciner. wegen eingetretener Salivation unterbleiben. An deren Stelle traten feuchtwarme Einwicklungen der ganzen Extremität, die 3 mal im Tage erneuert wurden. Das Fieber war fortwährend hoch, abendliche Temperaturen bis zu 39,8, Puls 96—104. Das Allgemeinbefinden im Ganzen war verhältnismäßig wenig gestört.

14. März. In der Nacht heftige, bohrende Schmerzen im Knie und Oberschenkel; dieselben vermehren sich auf Druck besonders in der Nähe des stark schwappenden Kniegelenkes. Ein Druck auf die Mitte des Oberschenkelknochens ist ebenfalls stark schmerzhaft, die Infiltration am Oberschenkel wenig zurückgegangen. Die Beweglichkeit des Kniegelenkes ist aktiv sehr beschränkt, Beugungsversuche sind äußerst schmerzhaft. Das Fieber ist beträchtlich gesunken. Die Abend-Temperaturen erreichen nur 38,2, Puls 86. Außer den Schmerzen klagt Patient noch über Gefühl allgemeiner Schwäche. Der Appetit ist fortwährend gut, des Nachts Schlaf mit geringer Unterbrechung.

15. März. Schmerzen etwas geringer. Die am 12. eingeleitete Behandlung mit feuchtwarmen Einwicklungen wird fortgesetzt.

17. März. Die Betastung des Femur ist für Patienten noch sehr empfindlich, spontan sind die Schmerzen etwas geringer. Die Infiltration in der Fossa poplitea und an der hintern Seite des Oberschenkels geht zurück. Die Haut ist von normaler Farbe. Das Strecken des linken Beines gelingt, indem Patient dasselbe auf die äußere Seite legt und es mit Hilfe des anderen Fußes in gestreckte Stellung bringt. Die Mensuration ergibt:

Mitte des Oberschenkels: R. 38, L. 39 cm; 2 Finger breit oberhalb der Patella: R. 32, L. 38 cm.

Der feröse Erguß des Kniegelenkes ist im Abnehmen begriffen, das Allgemeinbefinden bessert sich.

Die Temperaturen steigen Abends bis zu 38,5, des Morgens sind dieselben normal.

In den nächsten Tagen ging unter fortgesetzter Anwendung der feuchtwarmen Behandlung die Infiltration der Weichtheile immer mehr zurück, die Schmerzen wurden von Tag zu Tag weniger.

Am 22. März ergab die Untersuchung, die wegen der jetzt bestehenden Schmerzlosigkeit und Abnahme der Geschwulst sich ziemlich energisch ausführen liefs, Folgendes: Patient erträgt jetzt einen starken Druck auf Knie und Oberschenkel. Die Infiltration der Weichtheile ist fast ganz zurückgegangen, das untere Ende des Oberschenkels fühlt sich keulenförmig verdickt an und diese Verdickung gehört, wie deutlich fühlbar, dem Knochen an. Das Fieber ist ganz geschwunden, die Ernährungsverhältnisse bessern sich.

24. März. Die Messung ergibt Folgendes: über die Patella: L. 34, R. 31 cm; 3 Finger breit oberhalb: L. 36, R. 32 cm. Schmerzen sind keine mehr vorhanden, das Kniegelenk ist noch schwappend, doch viel weniger als früher und ist nur noch an einer Stelle, nämlich 1 Finger breit nach einwärts von der Patella auf Druck schmerzhaft. Dieser Punkt gehört dem innern, untern Ende des Femur an. Was die Funktion des Gelenkes betrifft, so ist die Extension jetzt passiv ganz durchführbar, aktiv nur bis zu einem stumpfen Winkel, die Flexion ist passiv bis zum rechten Winkel, aktiv ungefähr ebensoweit möglich, aber nur dann, wenn das Bein in auswärts rotirter Stellung auf einer harten Unterlage liegt. Die Extremität im Ganzen kann Patient ohne Hülfe der Hände von der Unterlage nicht entfernen.

In den nächsten Tagen änderte sich der Zustand insofern, als die Schwappung der Patella immer geringer wurde, die Schmerzhaftigkeit auf Druck immer mehr schwand und dafs Patient immer bessere Fortschritte im Gebrauche seines Gelenkes machte.

5. April. Die Messung ergibt: über die Patella: L. 33, R. 31 cm; oberhalb derselben: L. 35, R. 32 cm. Mitte der Wade: L. 27, R. 29 cm. Bei der Betaftung des Oberschenkels findet man den untern Theil enorm verdickt: Nach Art des Tafterzirkels gemessen: R. 6 cm, L. 12 cm. Patient kann jetzt ohne Nachhülfe das linke Bein emporheben, nach ein- und auswärts rotiren, im Knie bis nahe zum rechten Winkel beugen. Das Allgemeinbefinden bessert sich zusehends, ebenso der allgemeine Ernährungszustand.

Der seröse Ergufs und die damit verbundene Schwellung des Kniegelenkes geht immer mehr zurück, so dafs am 11. April die Messung nur noch 1 cm, am 19. April dieselbe nur noch  $1\frac{1}{2}$  cm Differenz zwischen rechts und links ergab.

23. April. Patient kann jetzt, wenn er sich am Bette hält, stehen und auch einige Schritte gehen, wenn letzteres auch mühsam.

26. April. Von nun an werden täglich mit Hülfe von Krücken Gehübungen gemacht. Das Bein wird dabei durch eine Bindeneinwicklung gestützt. Die Verdickung am Oberschenkelknochen bleibt sich nahezu gleich. Die Messung ergibt: über die Patella: R. 32, L.  $32\frac{1}{2}$  cm; unteres Drittel des Femur: R. 34, L. 37 cm. Mitte des Oberschenkels: R. 36, L. 39 cm.

Am 5. Mai hatte sich der Zustand so gebessert, dafs die Streckung im Kniegelenk aktiv wie passiv vollständig, die Beugung bis zu einem Winkel von  $45^0$  ausführbar war. Der Gang ist noch immer etwas unbeholfen, jedoch viel besser.

Während des Monats Mai wurden täglich Einreibungen mit starker Jodsalbe gemacht, Kochsalzbäder gegeben und die täglichen Gehübungen an den Krücken fortgesetzt; was den Gang betrifft, so war der Erfolg bald ein so guter, dafs Rubrikat bald die Krücken mit einem Stocke vertauschte und bei seiner am Ende des Mai erfolgten Entlassung aus dem Lazaret ohne Stock gehen konnte.

Was die übrigen Verhältnisse betrifft, so waren dieselben bei seiner Entlassung folgende: Das Aussehen des Patienten im Ganzen gut, Kräfte- und Ernährungszustand bedeutend gehoben, die frühere Anämie fast völlig verschwunden. Beide Kniegelenke bieten keine Differenz mehr dar, die linke Wade ist um  $1\frac{1}{2}$  cm weniger stark als die rechte. Der Umfang des linken Oberschenkels, 4 Finger breit oberhalb der Patella gemessen, beträgt links  $2\frac{1}{2}$  cm mehr wie rechts. Dafs die am untern Ende des linken Oberschenkels bestehende keulenförmige Verdickung dem Knochen selbst angehört, ist durch deutliches Umgreifen der Finger durch die vollständig normalen Weichtheile zu konstatiren und durch Mensuration nach Art des Tafterzirkels zu bestätigen. Preßt man nämlich durch die Weichtheile hindurch den Knochen zwischen die Finger, so kann man dieselben links bei stärkstem Druck nur etwa 10 cm nähern, während sie rechts in gleicher Weise auf 6 cm genähert werden können. Bei Beugung des Kniegelenkes fühlt die aufgelegte Hand hin und wieder deutliches Sehnenknarren. Was die Funktion des Gliedes betrifft, so kann Rubrikat ohne Stock ganz gut gehen; das längere Gehen ermüdet allerdings noch. Klopft man mit dem Finger, wenn auch nur leise, auf die Vorderfläche des Oberschenkels, so verspürt Patient, wie er angibt, ein eigenthümliches, unangenehm durchdringendes Gefühl, das er jedoch nicht gerade als schmerzhaft bezeichnen kann.

Wie aus der Krankengeschichte hervorgeht, machte das ganze Krankheitsbild anfangs den Eindruck, als ob man es mit einer spontanen Kniegelenksentzündung oder vielleicht auch mit acutem Gelenkrheumatismus zu thun habe; allein schon nach einigen Tagen zeigte der weitere Verlauf der Krankheit, dafs die Entzündung des Kniegelenkes sekundärer Natur war und dafs das primäre Leiden als eine acute Osteomyelitis des unteren Endes des linken Femurs, die sich mit entzündlichem Hydrops des Kniegelenkes complicirte,

angesprochen werden mußte, daß also, wie es gewöhnlich bei dieser Erkrankung zu sein pflegt, das zunächst gelegene Gelenk mitergriffen wurde und daß, da im Anfang die Entzündung desselben mehr in den Vordergrund trat, die Aufmerksamkeit auf das eigentliche Grundleiden erst späterhin gelenkt wurde. Von Hauptinteresse ist der schließliche Ausgang der Erkrankung, der gewiß, wie späterhin noch die Rede davon sein wird, zu den denkbar günstigsten zu zählen ist.

Was die Aetiologie des eben beschriebenen Falles betrifft, so gab Patient an, daß vor Beginn der Erkrankung sein linker Oberschenkel durch mehr als zweiwöchentliches, angestrenktes Nähen von Stiefelsohlen stark in Anspruch genommen worden sei.

---

Es sei mir gestattet, im Anschluß an den eben beschriebenen Fall über das Wesen der acuten Osteomyelitis Einiges hinzuzufügen und dabei die ätiologischen Momente, die derselben zu Grunde liegen sowie Verlauf und Ausgänge einer nähern Betrachtung zu unterziehen.

Die acute Osteomyelitis als solche war schon am Ende des 17. Jahrhunderts bekannt. In einem von Viany redigierten Cours du démonstrateur royal de St. Cosme (Jean Louis Petit), finden sich nach Vidal zwei in dieser Beziehung hierhergehörige Beobachtungen, die ich kurz anführen möchte:

1) Ein Mann von 30 Jahren erhält an der vordern Seite der Tibia einen heftigen Schlag. Anfangs scheint es sich nur um eine gewöhnliche Contusion zu handeln. Am 7. Tage aber wird er plötzlich von Schüttelfrost befallen, welcher in unregelmäßigen Zwischenräumen wiederkehrt. Er bekommt eine icterische Hautfärbung und stirbt. Man findet bei ihm einen Leberabscess, außerdem aber Eiteransammlung in den Zellen des spongiösen Gewebes der Tibia, welche durch die Erschütterung veranlaßt war.

2) Bei der Belagerung von Namur erhielt ein Ingenieur einen Flintenschuß am untern Theile des Beines, durch welchen der Knochen zerfchmettert wurde. Die Kugel liefs sich nicht ausziehen, und er starb. Man fand Eiterung in den Condylen der Tibia und innen Leberabscefs; „also“, sagt der Verfasser, „auch in den Knochenzellen kann es zusammentragen, wo die Materie gar keinen Abflufs haben kann.“

Wahrscheinlich sind in beiden Fällen die Lungen nicht untersucht worden, obgleich Petit die Ansicht ausspricht, dafs bei einer von den Knochen ausgehenden Metastase in der Leber, bei einer von den fibrösen Geweben ausgehenden in den Lungen metastatische Eiterablagerungen Statt fänden. (Bardleben, Chirurgie.)

Allein erst seit Chaffaignac (Gazette medicale 1854 No. 33 sqq.: Mémoires sur L'ostéo-myélite), dem wir die erste ausführlichere Beschreibung über akute Entzündung des Knochenmarks verdanken, finden wir dieselbe öfters in der Literatur verzeichnet; und hier sind es neben andern deutschen und französischen Autoren, Demme, später Roser, der 1865 in 30 Thesen das Bild der Osteomyelitis zusammenfasste, dann Lücke, Volkmann, Rosenbach und andere, die durch ihre Forschungen zur Erweiterung der Kenntnifs dieses wichtigen Krankheitsprocesses beitrugen.

Wie mannichfach auch die Ansichten der Autoren in Bezug auf die ätiologischen Momente der Krankheit auseinandergehen, darin stimmen alle überein, dafs von der höchsten Wichtigkeit für die Entstehung, ja als ein prädisponirendes Moment, die Wachstumsperiode des Knochens zu betrachten ist. Denn in diesem Stadium, in dem der Knochen beiläufig bis zum 25. Lebensjahr verbleibt, werden am Skelet an den am meisten beim Knochenwachsthum in Frage kommenden Geweben physiologische Zustände gesetzt, die wir als vorbereitend zu entzündlichen Processen auffassen müssen, es findet eine, allerdings in den Grenzen des Normalen sich haltende,

intensive Steigerung des Stoffwechsels an den im Wachsthum begriffenen Röhrenknochen statt; letztere sind es ja vorwiegend, die für die vorliegende Betrachtung hauptsächlich in Frage kommen. Es ist nun leicht erklärlich, dass bei einem so veränderten Gewebe, das gleichsam schon in einem vorbereiteten, allerdings physiologischen Stadium der Entzündung sich befindet, es nur einer relativ geringen Gelegenheitsfläche bedarf, um den pathologischen Prozess zu wecken. Wir müssen bei dieser Betrachtung vorausschicken, dass wir den Knochen in der Periode des Wachstums als ein einheitliches Organ auffassen müssen und die Hauptfaktoren, Mark und Periostr, als gleichzeitig von der Entzündung betroffen ansehen, wenn auch nicht gleichwerthig in Bezug auf Form und Stadium der Entzündung.

Neben dieser allgemeinen Prädisposition des Knochens zur Entzündung in der Entwicklungsperiode, dürfen wir noch einen wichtigen Moment nicht unberücksichtigt lassen, nämlich, dass gewisse Bezirke und zwar mit Vorliebe die Epiphysebezirke von der in Rede stehenden Entzündung befallen werden, während andere, wenn sie auch nicht ganz verschont bleiben, so doch ungleich feltner ergriffen werden. Da nämlich bei der Wachstumsperiode der intensivste und lebhafteste Stoffwechsel an Uebergang von Dia- zu Epiphyse stattfindet, so ist es leicht begreiflich, dass diese Gegenden wegen ihrer lokalen Prädisposition, Prädilectionsstellen der Entzündung sind. Wenn wir auf statistischem Wege vorgehen, so finden wir, abgesehen von den Phalangen, am häufigsten Femur und Tibia ergriffen und zwar hier wieder vorzugsweise oberes Ende der Tibia und unteres Ende der Femur.

Ein fernerer ätiologisches Moment bildet das Trauma, das in vielen Fällen Anlass zur Entstehung des in Rede stehenden Entzündungsprozesses gibt, so z. B. nach Verletzungen des Knochens, nach Knochenquetschungen, nach complicirten Frakturen, Amputationen und Resektionen. Sehr häufig nach

Schufswunden und zwar 5 — 6 Monate, nachdem wegen einer Schufswunde amputirt worden war. Die Osteomyelitis setzt sich dann von der Amputationsstelle bis zum nächsten Gelenke fort. Das Gelenk überspringt sie nicht, weshalb man den Rat gab, bei Schufswunden immer mehr zu exarticuliren, als zu amputiren. Von den letzteren Fällen sehe ich hier ab und möchte nur hervorheben, daß manchmal ein mehr minder starker Stofs oder Schlag, Ursache für die Entwicklung des Krankheitsprozesses abgeben kann. So erinnere ich mich z. B. eines Falles aus der Heidelberger chirurgischen Klinik, wo zu meiner Studienzeit im Jahre 1879, ein zwanzigjähriger, kräftiger Mann vorgestellt wurde. Es war ihm 3 Tage vorher ein schweres Fälschen mit ziemlicher Gewalt an die Vorderfläche der linken Tibia gerollt. Bald darauf verspürte er unter öfter wiederkehrenden Schüttelfrösten bohrende Schmerzen an der betroffenen Stelle, die nach und nach so unerträglich wurden, daß er ärztliche Hülfe in der Klinik suchte. Der Befund war damals folgender: An der Vorderfläche der Mitte der linken Tibia, entsprechend der kontusionirten Stelle eine mäfsige Anschwellung, die Haut glänzend, prall gespannt; die Schmerzhaftigkeit war an der betreffenden Stelle spontan ziemlich hochgradig und wurde auf Druck noch vermehrt. Temperatur local und im Allgemeinen erhöht. Die Diagnose wurde auf acute traumatische Osteomyelitis gestellt. Man entschloß sich, um die Schmerzen zu lindern, unter Beachtung antiseptischer Kautelen, zur Incision und es entleerte sich eine mäfsige Menge dicken, rahmigen Eiters, auf dessen Oberfläche Fetttröpfchen wahrzunehmen waren, ein Beweis für die Richtigkeit der Diagnose.

Auch in meinem Eingangs beschriebenen Falle war die von der Erkrankung betroffene Stelle einige Zeit vorher mäfsigen Infulten längere Zeit hindurch ausgesetzt; wenn ich auch nicht behaupten möchte, daß diese Infulten den Hauptgrund für die Entstehung der Entzündung abgaben, so dürfen wir

ihnen doch eine untergeordnetere Bedeutung nicht absprechen und vielleicht annehmen, daß, da wir es mit einem scrophulösen Individuum zu thun haben, die länger fortdauernde Inanspruchnahme des linken Oberschenkels durch das oben erwähnte angestrengte Nähen, die an einem gefunden Individuum vielleicht spurlos vorübergegangen wären, hier einen hinreichenden Reiz zur Entstehung der Entzündung abgab. Denn neben einer physiologischen allgemeinen Prädisposition, wie sie die Periode des Knochenwachsthumes darbietet, dürfen wir auch eine pathologische Disposition, wenn ich so sagen darf, nicht vergessen, ich meine damit die Scrophulose, Syphilis etc. Es ist ja leicht denkbar, daß eine geringe Gelegenheitsursache, wie Stofs, Fall, Schlag, bei einem gefunden Individuum kaum eine erhebliche Störung der Gesundheit hervorbringt, während wenn beispielsweise ein scrophulöser oder tuberculöser Körper davon betroffen wird, die relativ kleine Ursache genügt, um einen bedeutenderen Entzündungsprozeß einzuleiten. Wenn auch früher Lücke dem Trauma eine bedeutende Stellung unter den ätiologischen Momenten einräumte, so stimmt derselbe doch heute mit der Mehrzahl der Autoren darin überein, daß daselbe als nur von untergeordneter Wichtigkeit angesehen werden müsse und daß in der Mehrzahl der Fälle die acute Osteomyelitis spontan zur Entwicklung komme, zumal bei jugendlichen Individuen.

Lücke hat ferner darauf hingewiesen, daß in gewissen Jahreszeiten die Krankheit sich weniger oft bemerklich mache als in andern; so z. B. tritt, wie die Statistik zeigt, der Sommer fast ganz in den Hintergrund, während die Zeit von November bis inclusive Februar die weitaus größere Anzahl von Erkrankungsfällen aufweist.

Der Einfluß der Kälte, namentlich der feuchten, verbunden mit den Schädlichkeiten, die der Aufenthalt in schlecht gelüfteten Lokalitäten mit sich bringt, muß gewiß als disponirender Einfluß anerkannt werden.

Dafs durch ein Trauma, z. B. Quetschung eines Knochens, ein Blutergufs in das Knochenmark zu Stande kommen können, darin sind die meisten Autoren einig. Allein wie Kocher (deutsche Zeitschrift für Chirurgie „Die acute Osteomyelitis“) sagt, ist von der Hyperämie und dem Blutergufs in das Mark bis zu einer akuten eitrigen Entzündung noch ein grosser Schritt und er ist der Ansicht, dafs man nicht so ohne Weiteres nach unserer jetzigen Anschauung aus einer einfachen Hyperämie eine acute eitrige Entzündung hervorgehen lassen dürfe. Er fordert die Annahme eines Infektionsstoffes und kommt im Laufe seiner Betrachtungen zu dem Satze: „Die acute Osteomyelitis ist keine spezifisch-infektiöse Krankheit wie etwa Typhus, Scharlach und Diphtherie, sondern nur in demselben Sinne entstanden, wie jede andere acute Entzündung; es ist somit der Infektionsstoff kein anderer als derjenige, welcher die acute Entzündung auf Wunden veranlafst; derselbe könne sich in einem einfachen Absceffe vorfinden.“ Was die Beziehung der acuten Osteomyelitis zu andern Entzündungen betrifft, so haben Klose und Demme einen Zusammenhang zwischen ihr und Gelenkrheumatismus beobachtet, indem die Patienten an früheren Gelenkentzündungen gelitten hatten. Roser, Volkmann und Schede haben ebenfalls diesen Zusammenhang konstatirt, indem viele ihrer Patienten vorher oder nachher an Gelenkrheumatismus litten. Kocher hat 7 mal das secundäre Auftreten der acuten Osteomyelitis beobachtet, allerdings in sehr verschiedenen Fällen, darunter einmal bei Typhus und einmal bei Pyämie. Der im Verlauf des Typhus beobachtete Fall ist folgender: Das circa 3 jährige Kind R. von S. erkrankte während einer Typhusepidemie in S. an einem leichten Typhoidfieber im Herbst 1873. Vierzehn Tage nach Beginn der Erkrankung stellte sich eine acute diffuse Schwellung der linken Hand ein, welche in kürzester Zeit zur Abscedirung führte. Seither sind Fisteln zurückgeblieben und die Sonde kommt auf rauhen, federnden Knochen. Am 13 April

1874 wird die Operation gemacht und an der ersten und zweiten Phalanx des kleinen Fingers, der ersten des Daumens und den Metacarpus des 1. 2. 4. und 5. Fingers nach Eröffnung des Todtenladens mit relativ kleinen Kloaken die necrotische Diaphyse extrahirt. Dieselbe ist zum Theil zerstört, so daß in der Regel noch zwei Drittel der Länge und die Hälfte des Umfangs übrig geblieben sind und liegt inmitten schlaffer, mattgelber Granulationen.

Hier liegt also multiple, acute, secundäre Osteomyelitis nach Typhus vor.

Ein zweiter Fall dieser sekundären Form ist folgender:

Der 37jährige Samuel Rufiner von Blumenstein in Siders war am 24. September 1874 zur Behandlung eines Ulcus palati duri in's Spital aufgenommen worden. Dasselbe war erst als spezifisch betrachtet, aber ganz ohne Erfolg behandelt worden. Es hatte sich im Juni 1874 von einer acuten Periostitis maxillae superioris aus entwickelt. Mitte August hatte dieselbe recrudescirt. Es bestand gleichzeitig eine Fistel unter dem Auge. Unter den weichen Granulationen des Ulcus lag der harte Knochen bloß.

Nach 9 wöchentlichem Spitalaufenthalte wurde der bis dahin im Uebrigen gesunde Patient, der das Bett hütete, plötzlich von heftigen Schmerzen im rechten Unterschenkel befallen ohne objektive Veränderungen. Zu gleicher Zeit stellte sich ein heftiger Magenkatarrh ein mit Uebelkeit, Appetitlosigkeit und Fieber. Die Temperatur wurde leider erst vom 3. Dezember ab gemessen, hielt sich aber von dieser Zeit ab bis zum Tode am 13. Dezember beständig zwischen 39 und 40. Erst 5 Tage nachher wurden diffuse Röthung und Schwellung an der druckempfindlichen Stelle der Tibia wahrgenommen. Nun folgten sich täglich Metastasen: an den Metacarpalknochen, Ferse, Fußrücken, unterem Ende des Vorderarms und beider Oberarme, Jochbeingegegend. Meist trat erst Schmerzhaftigkeit, dann Rosenröthe, ziemlich diffus auf, dann Oedem. Die

Röthe wurde kupferfarben. Nur an der Tibia kam es zu umschriebener Eiterung.

Die Autopsie am 14. Dezember zeigte in den Lungen zahlreiche, kleine Herde, noch nicht in Eiterung übergegangen. Die Milz erheblich vergrößert. In der linken Tibiadiaphyse das Mark diffus, hellgelb eitrig infiltrirt. An den anderen Stellen ebenfalls kleine osteomyelitische Herde; nur an den letztergriffenen, so am linken untern Humerusende bestand bloß Hyperämie des Markes mit einzelnen Ecchymosen und ganz kleinen Eiterpunkten.

Hier handelt es sich um eine secund. pyämische Osteomyelitis tibiae. Ob hier die Infektion von der Necrose des Oberkiefers, oder ob sie von verschluckter Jauche ausgegangen, bleibt dahin gestellt (Kocher, deutsche Zeitschrift für Chirurgie.)

Es sei schliesslich hier noch eines Falles erwähnt, der deshalb mit von Interesse sein dürfte, da die Lokalisation der Erkrankung eine ungewöhnliche ist, indem das Hüftbein und die beiden anstossenden Gelenke gegen Kreuzbein und Oberschenkel ergriffen wurden:

Alfred H., 18 Jahre alt, ein zarter Jüngling, bekam am 7. Februar 1877 ohne Ursachen starke Schmerzen und Druckempfindlichkeit im Bereich der linken Spina ilei ant. sup. Darauf folgten bald Stiche auf der Vorderfläche der ganzen linken Unterextremität bis zum Fussgelenk. Am gleichen Abend bekam er Fieber, konnte Nachts wenig schlafen. Am nächsten Tag besuchte Patient noch die Schule, mußte sich aber Nachmittags zu Bette legen und bekam stärkere Schmerzen. Ein jetzt beigezogener Arzt behandelte ihn als acuten Gelenkrheumatismus. Erst am Abend des 10. Februar wurde das Fieber heftiger, am 12. Vormittags erfolgte ein eine halbe Stunde dauernder Schüttelfrost.

Am 11. Februar traten die ersten Schmerzen im Bereich des linken Malleolus externus auf. Erst am 17. wurde in der

Fossa iliaca int. sinistr. eine Schwellung wahrgenommen. Nachträglich wird angegeben, daß Patient schon um Neujahr 1877 spontane Schmerzen am Malleol. est. links bekommen habe, wesswegen er einige Tage hinkte, welche sich aber bald spontan verloren. Von der Zeit ab hatte er 4 bis 5 Wochen lang Durchfälle; dieselben bestanden noch zu Beginn jetziger Affektion.

Am 19. Februar kam der Patient auf die Klinik. Am linken Malleolus extern. bestehen die Zeichen einer Phlegmone mit Röthung und träger Fluktuation bis zum untern Drittel des Unterfchenkels aufwärts. Bei der Incision zeigt sich die Fibula rings entblößt, doch gut bläulich-roth vascularisirt und glatt. Das Periost ist eitrig infiltrirt, subcutane Abscesse vorhanden mit hellbläulicher, zeretzter Wand. Der Eiter hat ein auffälliges Aussehen, wie eine dicke Emulsion, fast breiig, von hellbläulichrother Farbe, Tibia und Fußgelenk erscheinen frei.

Oberhalb des linken Lig. Pouparti in dessen ganzer Länge findet sich eine Vorwölbung mit träger Fluktuation ohne Hautröthung. Es zeigt sich, daß es ein subcutaner Abscess mit derselben Wandung ist, wie die oben geschilderten Abscesse. Dagegen zeigte sich nach Ausen die Spina ant. sup. ilei. rauh und bloßliegend und von ihr hinweg eine handtellergröfse Parthie des Hüftbeins auf der Ausen- sowohl als Innenfläche bloßgelegt und das Periost abgehoben durch denselben dickbreiigen, hellbläulich-braunen Eiter, wie oben geschildert. Der Eiter enthält als Hauptbestandtheil Coccen in lebhafter Bewegung, aber nach nachträglich gemachter Untersuchung gar keine weitere Entwicklungsstadien derselben.

Der Schnitt wird längs des Beckenkammes ausen abwärts verlängert und behufs bessern Abflusses von der Innenfläche des Hüftbeins aus letzterem ein dreieckiges Stück herausgefägt. Beim Zusammenpressen desselben lassen sich an

mehreren Stellen gelbe Eitertropfen auspressen. Der Sägechnitt erscheint abwechselnd roth und gelb.

Am linken Sterno-clavicular-Gelenk hat sich seit dem 17. ein deutlich fluktuirender Abscess herausgebildet. Bei dessen Spaltung entleert sich nicht derselbe Eiter, wie an den erst ergriffenen Stellen; derselbe ist vielmehr hier von gelber Farbe, obchon auch dicker Consistenz. Seit eben derselben Zeit besteht ein kleiner subcutaner Abscess an der Stirne, der gespalten wird. Am vordern Umfang der Schulter besteht Druckempfindlichkeit.

Die Lippen sind mit trockenen, blutigen Borken belegt, die Innenfläche derselben zeigt Excoriationen. Am Ohrläppchen ebenfalls Borken. Am Herzen ist nichts Abnormes zu finden. Von der Stelle des Spitzenstosses bis in die Axillarlinie ein exquisites Reiben bei der Athmung. Die Milz ist deutlich vergrößert. Die Temperatur hat sich bisher ziemlich regelmässig zwischen 38 und 39 des Morgens, zwischen 39 und 40 des Abends bewegt.

Die Nachbehandlung wird strenge antiseptisch durchgeführt. Nach der Operation geht das Fieber allmählig herunter, am 20. und 21. nach Verabfolgung von je 6,0 Natr. salicyl. fogar auf 38,4 und 37,6 Abends und am 22. besteht Abends und Morgens Normaltemperatur. Dagegen delirirt Patient beständig heftig, verschiebt seine Verbände. Es besteht ziemlich bedeutende Dyspnoe, welche eine Dämpfung der linken, hintern untern Lungenparthien mit reichlichem Rassel entspricht.

Am 22. hat die Dämpfung auf der Lunge zugenommen, das Athmungsgeräusch ist zum Theil aufgehoben an der Stelle und deutliches Reiben aufgetreten.

Des Abends treten Erscheinungen einer diffusen Entzündung auf, ausgehend von der Wunde am Sterno-clavicular-gelenk, wo der Verband verschoben war und eine spätere Temperaturmessung ergibt denn auch ein rasches Steigen des Thermometers.

Am 23. ist die Temperatur des Morgens 40,0. Die Röthung und die ödematöse Infiltration nimmt die ganze Vorderfläche des Halbes ein. Die Beckenwunde ist trocken, erscheint etwas geschwellt. Die Dyspnoe ist in Zunahme begriffen, beständige Delirien. Unter Eintreten von Collapstemperatur tritt Nachmittags der Tod ein.

Die Autopsie ergibt Folgendes:

Die Haut am Halbe zum Theil blauröthlich verfärbt. Die linke Fibula in grosser Ausdehnung entblöst. Epiphysenlösung. Beim Durchsägen der Fibula zeigt sich das Mark des unteren Dritttheils eitrig infiltrirt. Die Tibia ist in der Mitte einige Centimeter weit vom Periost entblöst und von Eiter umspült. Das linke Fussgelenk vereitert, die Knorpel zum grossen Theil verschwunden, die Knochenoberfläche schwarz verfärbt.

Im Herzbeutel viel braunrothe, trübe Flüssigkeit mit zahlreichen Fibrinflocken.

In der linken Pleurahöhle circa 600,0 einer der eben erwähnten ganz ähnlichen Flüssigkeit. Am Herzen nichts Besonderes.

Linke Pleura mit fibrinösen Membranen bedeckt. Unter denselben zahlreiche, hirsekorngrosse braunrothe Flecken, welche auf dem Durchschnitte mit dem Lungengewebe innig verbunden erscheinen. Mikroskopisch erweisen sich dieselben als kleine Fettembolien. Im linken Oberlappen ein Infarkt mit Demarcations-Entzündung, im Unterlappen mehrere in Vereiterung begriffene, reiskorngrosse Infarkte. An der rechten Lunge frische Pleuritis mit den gleichen fettembolischen Herden wie links. Starke Milzschwellung. Pulpa blass. Follikel klein.

Linke Niere sehr gross, auf der Schnittfläche mehrere Eiterherde, Parenchym getrübt.

Reichlicher dünner Eiter im linken Hüftgelenk und der linken Synchondrosis sacro-iliaca; ebenso im rechten Sterno-claviculargelenk mit Verfärbung und Arrosion der Knorpel.

Außer der Lokalisation der Erkrankung ist der Fall insofern noch bemerkenswerth, als die Affektion einige Wochen vorher schon sich zu entwickeln drohte, sich jedoch wieder unter den Erscheinungen von heftigen Durchfällen zurückbildete.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des Verlaufs und der schließlichen Ausgänge der ac. prim. Osteomyelitis, so sehen wir, daß in einer ganzen Reihe von Fällen, und weit aus in der Mehrzahl, es zu dem bekannten Bilde der Necrose kommt, daß die Ausgänge, wo wir es mit einer Vereiterung und Totalnecrose des ergriffenen Knochens unter bedrohlichen Allgemeinererscheinungen und schließlichem letalen Ausgang unter dem Bilde der Pyämie und Septicämie zu thun haben, leider nicht zu den seltenen gehören und daß es nur wenige gibt, wo wir einem Rückbildungsprozesse begegnen. Denn zu dem denkbar günstigsten ist gewiß der Verlauf derjenigen Fälle zu rechnen, wo sich die Krankheit, wie in dem Eingangs beschriebenen Fall, unter den Erscheinungen einer ossificirenden Periostitis sich zurückbildete und mit einer keulenförmigen Verdickung des untern Endes des Femurs abschloß, die, auch nach längerer Beobachtung, die Funktion der betreffenden Extremität nur unwesentlich beeinträchtigte.

Dr. Paul Vogt beschreibt „in Volkmanns Sammlung klinischer Vorträge“ über acute Knochenentzündung in der Wachstumsperiode, einen dem Eingangs beschriebenen ganz analogen Fall, den ich mir in Kurzem zu scizziren erlaube:

Ein jugendliches — circa 17 Jahre altes — männliches Individuum, erkrankte ohne besondere Veranlassung mit Schmerzen und Anschwellung der rechten Kniegegend. Patient wurde Anfangs als an Gelenkrheumatismus erkrankt behandelt, bald darauf jedoch der Klinik überwiesen, wo eine genauere Inspektion ergab, daß die Volumsvermehrung der rechten Kniegegend im Wesentlichen dem untern Drittel des Oberschenkels angehöre; es wurde ferner konstatiert, daß die Be-

taftung des Kniegelenkes weder besondere Schmerzhaftigkeit noch besondere lokale Temperaturerhöhung ergab, dafs aber ein Druck auf eine Stelle oberhalb der Condylen enorme Schmerzen verursachte; dieselben wurden nach oben und unten von der genannten Stelle weniger intensiv. Aktive Bewegungen wurden vorsichtig vermieden, passive waren der grofsen Schmerzen wegen kaum ausführbar. Mit Rücksicht auf diesen Befund, dem noch beizufügen ist, dafs ein fortwährend allgemeiner hoher fieberhafter Zustand bestand, wurde der Knochen selbst als erkrankt angesprochen und die Diagnose auf acute Osteomyelitis und Osteochondritis gestellt. Auch hier ging in analoger Weise der Prozeß unter Zurücklassung einer starken Verdickung, die bei energischem Betaften zweifellos als dem Knochen selbst angehörend zu erkennen war, dem günstigsten Ausgang entgegen.

Die acute Osteomyelitis als solche in ihren Anfängen zu diagnosticiren gelingt manchmal leicht, hat aber doch auch hin und wieder ihre Schwierigkeiten. Die Art und Weise des Verlaufs, resp. die ersten Anfänge gipfeln hauptsächlich in Klagen über intensive lokale Schmerzhaftigkeit, die meist ihren Sitz an der Uebergangsstelle von Dia- zu Epiphyse hat, vom Patienten aber fälschlich in das zunächst gelegene Gelenk verlegt werden, wie es auch bei unfarm Patienten der Fall war. Ein Druck auf die Epiphysenlinie, der gewöhnlich ganz enorme Schmerzhaftigkeit hervorruft, ist Beweis genug für die eigentliche Lokalisation. Mit der Schmerzhaftigkeit geht dann bald eine gewisse Funktionsstörung der betreffenden Extremität einher. Patient verbringt zwar die ersten Tage noch aufer Bette, allein sein Gang ist hinkend, da das feste Auftreten, wobei Epi- und Diaphyse zusammengepreßt wird, empfindlich ist. Allein trotz Schmerzhaftigkeit und Funktionsstörung ist manchmal in den ersten Tagen aufer einer mäfsigen Anschwellung des benachbarten Gelenkes nichts weiter sichtbar. Allein das hohe Fieber und die damit verbundene intensive Störung des Allgemeinbefindens, die in keinem Verhältnifs zum objek-

tiven Befunde stehen, geben uns doch schon einen Fingerzeig, daß wir es mit einem ernststen Krankheitsprozeß zu thun haben. Ist nun in den folgenden Tagen eine Anschwellung zu konstatiren, so hat dieselbe, wie manche Autoren angeben, darin etwas Charakteristisches, daß dieselbe an der Epiphyselinie scharf abschneidet, während sie sich gegen die Diaphyse hin nach und nach verjüngt, somit eine keulen- oder kolbenförmige Figur darbietet, mit der Dicke gegen die Epiphyse gerichtet. Diese Form als solche ist jedoch im Anfang wegen der harten Infiltration der Weichtheile schwer zu fühlen. Wie schon oben erwähnt, ist von Wichtigkeit die Affektion des benachbarten Gelenkes; gewöhnlich erkrankt das dem osteomyelitischen Herde zunächst gelegene Gelenk und bietet in manchen Fällen das Bild einer reinen serösen Synoritis dar, in andern Fällen wieder mehr das Bild der eitrigen. Das hohe Fieber, das gewöhnlich die Krankheit begleitet, hat an und für sich nichts Charakteristisches, allein immerhin ist das konstante Anhalten der hohen Temperatur von hoher Bedeutung. Ist man nur mit Zuhülfenahme dieses Symptomen-Komplexes zur Diagnose gekommen, so wird sich die nächste Frage daran schließen, wie soll man therapeutisch vorgehen und wie stellt sich überhaupt die Prognose?

Es wird bei der Beantwortung dieser Frage zunächst von großer Bedeutung sein, in welchem Stadium und unter welchen begleitenden Umständen wir dem Krankheitsprozeß entgegen treten. So empfiehlt Demme beim acuten Stadium das expectative Verhalten, d. h. zuzuwarten, bis der Krankheitsstoff sich an den im Organismus gegebenen Widerständen, der desinficirenden Eigenschaft des Blutes und der Gewebe spontan erschöpft habe, ein Zustand, der sich dadurch bemerklich mache, daß nach und nach die Erscheinungen der acuten Entzündung örtlich zurückgehen und besonders die Temperatur in der Weise abfalle, daß das Fieber einen hektischen Typus annehme, in manchen Fällen auch die Abendtemperaturen

sinken.“ Es ist allerdings sicher, daß in einer ganzen Reihe von Fällen bei dieser Methode der Erfolg ein gesicherter ist, allein doch immerhin nur bei den leichteren Fällen. Doch ist es auch hier schon räthlich, das erkrankte Glied durch einen Verband zu fixiren — etwa in einer gut gepolsterten Rinne; denn ein circulärer Verband würde wegen der wachsenden Schwellung und der Empfindlichkeit kaum ertragen werden; ferner dürfte die Applikation einer Eisblase sich empfehlen.

Anders ist das Verhalten bei den schwereren Fällen. Wollte man sich auch hier nur exspectativ verhalten und von jeglichem chirurgischem Eingriff absehen, so ginge ein Theil der Kranken acut zu Grunde, bei einem andern würde es spontan zum Aufbruche kommen, und der Zustand nach und nach ein chronischer werden. Demme gibt auch die Indication einer Punktion im akuten Stadium zu und erkennt den Werth derselben an; allein er wandte sich mehr der energischen Bepinselung mit Jodtinctur zu, die, wie auch Billroth bestimmt, durch Reforption lokal und allgemein desinficirend wirke. Ob aber diese Behandlung allein auch für die ernstesten Fälle ausreicht, muß doch bezweifelt werden. Die Entzündungsprodukte sollen möglichst früh durch Punktion oder kleine Incisionen entfernt werden. Erstere hat vor letzteren den Vortheil, daß man dabei einen größern Eingriff vermeidet und sich von antiseptischen Verbänden unabhängig macht. Allein in vielen Fällen wird die Punktion allein, wenn größere Eiterherde nachzuweisen sind, zur Entfernung des Entzündungsproduktes nicht ausreichen und man wird, natürlich unter strenger Beobachtung antiseptischer Kautelen, sich zur Incision entschließen müssen, um eine vollständige Entleerung zu erzielen. In den leichteren Fällen hat man durch kleine Incisionen in der Epiphyse nlinie, auch wenn dadurch nur einige Tropfen Eiters entleert wurden, gute Erfolge erzielt. Es ist jedoch nicht genug, die Eiterherde unter der Anwendung der Antiseptis zu entleeren und zu desinficiren, sondern es muß, wie

„Kocher“ sagt, die Desinfection vorangestellt werden. Er beschreibt mehrere Fälle acuter Osteomyelitis, bei denen Abscesse nur unvollkommen entleert wurden, allein durch Anwendung konsequenter Carbolinjectionen gute Resultate erzielt wurden; dabei verdient jedoch eine energische Alcohol-Verabreichung besondere Berücksichtigung. Es sei mir gestattet, einen der dort beschriebenen Fälle, der auch wegen seiner Aetiologie, indem hier die beiden Hauptgelegenheitsursachen, die bei der acuten Osteomyelitis gewöhnlich in Frage kommen, nämlich Trauma und evidente Erkältung, besonders Interesse darbietet, in Kurzem anzuführen:

Benedikt Glauser, 25 Jahre alt, Landarbeiter von Zauggenried, fiel in angeheitertem Zustande am 2. December 1877, 15 Fufs hoch über eine Brücke hinunter in einen Bach. Er arbeitete aber 8 Tage lang unbehindert weiter und verrichtete schwere Arbeit. Am 9. December bekam Glauser ohne alle weitere Ursache, als er in der Stube safs, stechende Schmerzen über dem innern Drittel der linken Clavicula. Er vermied von da ab der Schmerzen wegen die Bewegungen des betreffenden Arms. Schon in der folgenden Nacht trat starke Hitze ein und konnte Patient nicht schlafen.

Am 12. wurde ein Arzt konsultirt, welcher über der innern Hälfte der Clavicula starke Druckempfindlichkeit, aber ohne jede objektive Veränderung konstatierte. Am 14. Mittags wurde eine Temperatur von  $40,2^{\circ}$  gemessen und erst jetzt fand sich an der schmerzhaften Stelle der Clavicula eine Schwellung vor. Die Temperatur blieb zwischen 39 und 40. Erst am 16. trat ein länger dauernder Schüttelfrost auf und unmittelbar nachher bekam der Patient Schmerzen im linken Femur, auf der Aussenfete desselben und auf der rechten Schulterhöhe.

Vom 13. bis 15. bestand täglich mehrfach Erbrechen, dagegen war kein Durchfall vorhanden.

Am 15. wurden vom Arzte Lungenerscheinungen konstatiert. Husten und Dyspnoe sollen erst am 16. aufgetreten sein.

Patient war früher gesund. Am 17. December wurde er auf die Klinik aufgenommen. Status: Ueber der linken Clavicula die Erscheinungen einer diffusen Phlegmone mit Fluktuation über dem innern Ende. Zum Unterschied von einer gewöhnlichen Phlegmone aber ist die Infiltration der Haut gering, mehr bloß ödematös, die Farbe derselben mehr bläulichroth als intensiv roth, die Druckempfindlichkeit nur im Verlaufe der Clavicula sehr entschieden ausgesprochen. Es ist also eine sekundäre Phlegmone, ausgehend von acuter Periostitis und letztere muß auf Grund der übrigen, gleich zu schildernden Erscheinungen und ganz vorzüglich der Anamnese auf eine primäre acute Osteomyelitis claviculae bezogen werden.

An der Aussenfläche des rechten Femur eine dem Knochen aufliegende, nicht genau umschriebene Schwellung mit starker Druckempfindlichkeit (Periostitis femoris circumscripta). Auf dem rechten Acromio Claviculargelenk eine diffuse Schwellung mit leicht bläulichrother diffuser Verfärbung und Infiltration der Haut, sehr druckempfindlich. Bewegungen auch dieses Arms können nur mit Schmerzen ausgeführt werden; ebenso erregt jeder Druck auf die Clavicula Schmerz (Synovitis acuta acromio-clavicularis.) Die sechste rechte Rippe ist am vordern Ende (nach Aussen von der Mamillarlinie) verdickt und außerordentlich druckempfindlich. Patient ist etwas schlaffüchtig, hat geröthetes Gesicht, feuchte, weiß belegte Zunge, leicht dyspnoische Athmung, Husten und Seitenschmerzen, die Herztöne sind rein. Rechts hinten vom Winkel der Scapula abwärts besteht Dämpfung, vermindertes Athmen und Fremitus und Reibegeräusch am Ende der Inspiration (Pleuritis dextra). Temperatur 38,0 Morgens, 39,2 Abends.

Der Urin ist klar; deutliche Trübung beim Kochen, auch nach Säurezusatz. Milzdämpfung nicht vergrößert, Abdomen normal.

20. December. Die Fluktuation über der linken Clavi-

cula ist viel ausgedehnter geworden und eine solche auch über der sechsten Rippe aufgetreten. An letzterer wird außerdem eine unter Knacken an der Verbindungsstelle mit dem Knorpel einhergehende falsche Beweglichkeit konstatiert — Epiphyseolytis). Im Bereich der Dämpfung der rechten Lunge ist sehr deutliches Bronchialathmen zu hören (Pleuropneumonie). Da der Fall noch keine offene Wunde darbietet, so wird beschlossen, eine solche, zunächst behufs genauen Studiums des Falls möglichst lange zu vermeiden. Am 21. wird der Abscess an der Clavicula und an der Rippe mittelst Aspiration entleert. Der Eiter ist geruchlos, enthält reichliche Coccus; er ist emulsionsartig schmutzig weiss, rahmartig dick. An beiden Stellen wird 1.0 der 5% Carbollösung injicirt; ebenso ohne vorgangige Entleerung am rechten Acromio-Claviculargelenk. An Rippe und Clavicula kommt der Ansatz der Spritze auf rauhen Knochen.

Mit dieser Behandlung wird nun konsequent täglich fortgefahren neben innerlicher Verabreichung von Cognac. Die phlegmonösen Erscheinungen bilden sich sehr rasch zurück, das Fieber ist schon am 24. auch des Abends auf 38,0 gesunken und von da ab mit vereinzelten Recrudescenzen bis auf 39,0 hält es sich auf Normaltemperatur.

Am 26. ist die Pneumonie des rechten Unterlappens deutlich in Lösung. Patient schwitzt sehr stark.

2. Januar. Auf der linken Clavicula hat sich eine Fistel gebildet, welche mit einem antiseptischen Verband geschützt wird. Am rechten Acromio-Claviculargelenk und auf der 6. Rippe ist die Fluktuation verschwunden. Die Lungenaffektion ist zurückgebildet.

Am 6. Januar ist die Temperatur Abends 39,0 und Patient klagt über Schmerzen im Gefäss. Es findet sich eine von der Synchrondrosis sacro-iliaca sinistr. ausgehende, fast faustgrosse, sehr druckempfindliche Infiltration in die Glutaei

hinein. Am 7. werden in dieselbe 2,0 Carbolölösung injicirt und damit fortgesetzt.

Am 8. Januar ist über der Sychondrose deutliche Fluktuation wahrzunehmen.

11. Januar. Die Schwellung an den Nates ist heute bedeutender und druckempfindlicher, nachdem gestern keine Carbolinjection gemacht worden ist. Daher werden dieselben heute wieder aufgenommen. Die Temperatur ist wieder auf das normale Niveau herabgegangen, um fernerhin nicht wieder zu steigen.

16. Januar. Die Schwellung an den Nates ist in vollständiger Rückbildung.

19. Januar. Da nicht anders anzunehmen war, als daß die letzte Metastase von dem Knochenmarkherd in der linken Clavicula ausgegangen war und im Interesse der Abkürzung der dort in Ausbildung befindlichen Necrose und Sequestrirung wird heute die Resectio claviculae ausgeführt. Die Diaphyse zeigt sich in  $\frac{2}{3}$  ihrer Länge bloßgelegt, außen glatt, innen mit unregelmäßigen Periostwucherungen. Nach außen besteht eine deutliche Demarcationslinie und es wird hier mit der scharfen Zange getrennt, dann läßt sich mit Leichtigkeit die innere Partie ( $\frac{2}{3}$  der ganzen Länge der Clavicula) sammt dem Gelenktheil mit dem Elevatorium heraushebeln. Die zurückbleibende Höhle ist glatt; nach unten besteht eine subfasciale Senkung, welche drainirt wird.

Die Untersuchung des resecirten Stückes zeigt nur unregelmäßige Sequesterbildung neben noch wohl erhaltener Corticalis. Ein Sequester geht in ganzer Dicke durch und ist 5 cm lang, die andern sind kleiner. Das Mark ist in ganzer Ausdehnung im Zustande der Granulation, von blafs-röthlicher Farbe und bricht in kleinen und größern Fortsätzen durch die Corticalis hindurch. An einer Stelle ist die letztere weit geöffnet in der Nähe der Epiphyse.

Letztere erscheint in ihrer Spongiosa nicht verändert,

dagegen ist die Oberfläche rauh, der Knorpel ganz verschwunden und die oberflächliche, schmutzig-weiße aussehende Corticalis unter demselben durch eine tiefe Furche von den übrigen Knochen abgegrenzt.

Der weitere Verlauf war ein ganz günstiger fieberloser. Am 10. Februar wurde ein Gypsverband angelegt, welcher am 2. März entfernt wurde, da die Narbe ganz gebildet war. Bei der Entlassung am 7. März lassen sich an Stelle der frühen Metastasen gar keine Veränderungen mehr nachweisen, an Stelle der resorbierten Clavicula ist ein schon ziemlich solider periostaler Knochen gebildet. Patient vermag schon den Arm wieder etwas nach vorne hin zu erheben.

Nach Kocher muß jedoch die Desinfektion eine zweifache sein: 1) eine allgemeine und 2) die eines jeden einzelnen auftretenden Herdes im Besondern für sich. Die erste wurde im Allgemeinen früher von den Chirurgen weniger beachtet, ist jedoch nach seiner Ansicht, wenn man die Krankheit gewöhnlich begleitende Affektion der Verdauungswege in Betracht zieht, keineswegs außer Acht zu lassen. Bestehen Appetitlosigkeit, übelriechende Durchfälle, Meteorismus, Leibschmerzen, so will er diese Zersetzungs Vorgänge direkt bekämpfen wissen und führt eine Reihe von Fällen an, wo er durch die innerliche Darreichung von großen Dosen Natr. salicyl. — entsprechend dem Alter der Patienten und der Intensität der Affektion der Verdauungswege — evidente Erfolge erzielt hat. Wird das Medikament nicht vertragen, so führt er dasselbe per rectum ein. Da jedoch dieses in manchen Fällen wegen der Affektion des Magens zur Aufnahme der Nahrungsmittel verwendet werden muß, so ersetzt er das Medikament durch Verabreichung von Alkohol in Form schwerer Weine und will damit gute Resultate erzielt haben.

Die lokale Desinfektion ist jedoch das Wichtigere; er führt dieselbe, wie oben schon angedeutet, durch Entleerung

des Entzündungsproduktes vermittelt des Aspirators und darauffolgender Injektion von Carbolensäure aus und zwar alle 1—2 Tage 2—3 Spritzen (Pravaz) einer 5% Lösung.

Im Anfang der Erkrankung wo noch keine Abscesse nachweisbar sind, müßte man dieselbe, um eines Erfolges möglichst sicher zu sein, durch Einstechen in die Epiphyse ausführen. Der Erfolg der lokalen Infektion wird also im Allgemeinen im innigen Zusammenhang damit stehen, wie früh man, resp. in welchem Stadium man die Krankheit in Behandlung bekommt. Hat schon eine spontane Eröffnung und eine septische Infektion des Entzündungsherdes stattgefunden, so wird man nicht mehr hoffen dürfen, durch Carbolinjektionen den Prozeß rückgängig machen zu können, sondern man wird auf die baldige Entfernung des Herdes und aller inficirten Gewebe denken müssen.

Es müssen also nach dem eben Gefagten zwei haupttherapeutische Maßnahmen auseinander gehalten werden: 1) eine solche, wo es die Hauptsache ist, lokal den Entzündungsherd zu desinfizieren und die Entzündungsprodukte zu entfernen, so weit dies geschehen kann ohne der 1. Indikation Schaden zu bringen; 2) eine solche, wo nicht nur die Entzündungsprodukte selbst, sondern die ganze benachbarte inficirte Umgebung gründlich entfernt werden muß und wo die Desinfektion nur als Zugabe einer antiseptischen Wundbehandlung aufzufassen ist. Im 1. Stadium haben wir also noch keine Kommunikation der äußern Luft mit dem Entzündungsherde, im 2. Stadium haben sich zu ihm septogene Stoffe aus der Luft gesellt.

Einzelner seltener Fälle wären noch zu gedenken, wo die Krankheit von vorne herein, lokal und allgemein, einen so durch und durch infektiösen Charakter zeigt, so daß es unbedingt indicirt erscheint, das Knochenmark zu eröffnen oder zur Totalexstirpation einer Diaphyse resp. Knochens oder gar zur Amputation zu schreiten.

Schliesslich sind diejenigen Fälle noch anzuführen, wo es nach Ablauf des akuten Entzündungsstadiums zur partiellen Necrose kommt. Von Wichtigkeit ist dabei die Frage, wann soll man zur Necrotomie schreiten?

Nach den allgemeinen Erfahrungen wird man, solange der necrotische Knochen noch in fester Verbindung mit dem gefunden Theil steht, zuwarten, da Aussicht ist, dass der necrotische Bezirk kleiner werde. Klose gibt an, 3 Fälle beobachtet zu haben, wo nach Wochen und Monaten der necrotische Knochen vollständig verschwunden und die Wunde zugeheilt sei, ohne dass eine Knochenausstossung stattgefunden hätte, indem die Granulationen der anstossenden Haversischen Kanäle, Marks und Perioste in die Kanäle des todten Knochens einwuchsen, denselben aufzehrten resp. wieder vaskularisirten und belebten. Allein das sind gewiss äusserst seltene Fälle von günstigstem Verlauf und man muss im Grossen und Ganzen den Satz festhalten, man soll den necrotischen Knochen dann entfernen, sobald er sich gelöst oder gelockert hat, was bei Kindern gewöhnlich 6 Wochen, bei Erwachsenen 3 Monat dauert.

Im Uebrigen muss man sich bei der Therapie einen allgemeinen Gesichtspunkt wahren und individualisirend zu Werke gehen. Es lässt sich eben eine schematenmässige Behandlung nicht durchführen und die möglichst exakte Erwägung aller die Krankheit begleitenden Erscheinungen wird für die Entscheidung der im einzelnen Falle einzuleitenden Therapie am meisten massgebend sein.

Herrn Stabsarzt Dr. Hagen sage ich schliesslich für die gütige Ueberlassung des Falles meinen besten Dank.

---



